

**TEPEZZA**<sup>®</sup>  
teprotumumab-trbw

# Tratamiento de la enfermedad ocular tiroidea con TEPEZZA

Una guía para iniciar  
el tratamiento con  
confianza

Lea la Información de  
Seguridad Importante  
de TEPEZZA en las  
páginas 17 a 19 o visite  
[TEPEZZA.com](http://TEPEZZA.com).

MÁS DE  
**15,000**  
PACIENTES  
TRATADOS

Randi C.,  
paciente real de TEPEZZA



## ¡Su recorrido comienza aquí!

Ha dado un paso importante hacia el tratamiento de la enfermedad ocular tiroidea (TED). Si bien la TED puede privarlo de mucho, usted no permitió que lo detenga. Tomó el control, obtuvo respuestas y encontró la ayuda que necesitaba. Usted y su médico eligieron TEPEZZA, el primer y único tratamiento aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para la TED.

En Horizon, sabemos que comenzar un nuevo tratamiento puede ser abrumador. Es por eso que nos comprometemos a ayudarlo a sentirse seguro durante todo el proceso de tratamiento. Horizon By Your Side es un programa de apoyo para pacientes con un equipo de miembros especializados que aplican un enfoque personalizado para satisfacer las necesidades únicas de cada paciente. Ya sea que necesite apoyo personal, ayuda con el seguro y con los costos, o recursos útiles, el equipo de Horizon By Your Side puede ayudarlo a lo largo del proceso de su tratamiento.

Después de que se inscriba en Horizon By Your Side, le asignarán un coordinador de acceso de pacientes (PAL). Su PAL le da apoyo exclusivo y personalizado. Trabaja directamente con usted para responder preguntas que no sean médicas y de logística, y para darle apoyo una vez que le hayan recetado TEPEZZA y haya completado la inscripción.



Si quiere inscribirse en Horizon By Your Side, llame al

**1-833-583-7399**

De lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., hora del este (ET)

---

### USO

TEPEZZA es un medicamento de venta con receta que se usa para tratar la enfermedad ocular tiroidea, independientemente de si la tiene hace meses o años.

# En el interior de esta guía, encontrará información sobre:

**Cómo puede ayudar TEPEZZA con la enfermedad ocular tiroidea**  
Vea los beneficios del tratamiento con TEPEZZA..... 4

**Cómo se administra TEPEZZA**  
Sepa cómo se administra TEPEZZA y con qué  
frecuencia recibirá tratamiento ..... 8

**Dónde administrarse las infusiones**  
Conozca dónde se administran las infusiones de TEPEZZA .. 10

**Cómo actúa TEPEZZA**  
Mire cómo TEPEZZA trata la TED en su origen ..... 12

**Qué hacer antes de comenzar a administrarse TEPEZZA**  
Lea algunos puntos que su médico querrá  
saber antes del primer tratamiento con TEPEZZA ..... 14

**Efectos secundarios frecuentes de TEPEZZA**  
Consulte los efectos secundarios más frecuentes  
a partir de los estudios clínicos de TEPEZZA..... 15

**Información de Seguridad Importante** ..... 17



Antes del tratamiento con TEPEZZA, no quería tomarme fotos. Me inhibía mi apariencia. Me dejaba las gafas de sol puestas toda la noche. Cuando teníamos eventos y había cámaras, me escondía. Después de TEPEZZA, me siento bien. Recuperé mi sonrisa. Y llené de selfis mi cámara”.

— Bridget B., paciente real de TEPEZZA



**Lea la Información de Seguridad Importante de TEPEZZA en las páginas 17 a 19 o visite [TEPEZZA.com](https://www.tepezza.com).**

# Cómo puede ayudar TEPEZZA con la enfermedad ocular tiroidea

TEPEZZA fue probado mediante 2 estudios clínicos en personas recientemente diagnosticadas con enfermedad ocular tiroidea moderada a grave. Todas ellas sufrían de protusión de los ojos, dolor de ojos, enrojecimiento e hinchazón. Algunas personas también tenían visión doble. Los estudios tuvieron una duración de 24 semanas, durante las cuales se medían los cambios en la protusión en los ojos y la visión doble. También se evaluaron los signos y síntomas de la inflamación, entre ellos, dolor alrededor de los ojos y detrás de los ojos, enrojecimiento, hinchazón y cambios en la capacidad visual y la apariencia.

## Vuelva a lucir más como usted mismo

En un estudio clínico, más de

**8 de cada 10** 

personas que recibieron tratamiento con TEPEZZA notaron una reducción en la protrusión de los ojos.\*

\*La protrusión de los ojos se redujo por lo menos 2 mm.

## Vea con mayor claridad

En estudios clínicos,

**7 de cada 10** 

personas que recibieron tratamiento con TEPEZZA notaron mejoras en la visión doble.

**Más de 5 de cada 10 personas notaron que la visión doble desapareció por completo.**

Lea más Información de Seguridad Importante de TEPEZZA en las páginas 17 a 19 o visite [TEPEZZA.com](https://www.tepezza.com).

## Obtenga el alivio de múltiples síntomas

---

En un estudio clínico,

# 2 de cada 3

personas que recibieron tratamiento con TEPEZZA tuvieron como resultado poco o nada de:



**Dolor de ojos**

incluido detrás de los ojos  
o cuando los movían



**Enrojecimiento**

de ojos o párpados



**Hinchazón**

de ojos o párpados

## Fotos de pacientes reales

---

Vea cómo TEPEZZA ayudó a personas reales como usted con la enfermedad ocular tiroidea.

**Antes del tratamiento con TEPEZZA**



**Después del tratamiento (semana 24)**



Paciente real que recibió tratamiento con TEPEZZA. Los resultados pueden variar según cada persona.

## Información de Seguridad Importante selecta

Pueden presentarse reacciones en el momento de la infusión de TEPEZZA o en las 24 horas siguientes. Si usted tiene una reacción mientras recibe TEPEZZA, el médico o enfermero administrará la infusión más lentamente o la suspenderá y tratará la reacción. Si tiene una reacción grave, el médico podrá interrumpir el tratamiento por completo.

# Los estudios más recientes demuestran que TEPEZZA puede ayudar a pacientes que tienen enfermedad ocular tiroidea hace años\*

## Vuelva a lucir más como usted mismo

En un nuevo estudio clínico, más de

**6 de cada 10** 

personas que recibieron tratamiento con TEPEZZA notaron una reducción en la protrusión de los ojos.†

## Mejore su capacidad visual


Los pacientes del estudio que recibieron tratamiento con TEPEZZA informaron una mejora en su capacidad visual que simplificaba actividades cotidianas como:



**Caminar  
al aire libre**



**Leer**



**Ver  
televisión**



**Conducir**

\*Diagnosticados con TED 2 a 10 años antes de recibir tratamiento con TEPEZZA.

†La protrusión de los ojos se redujo por lo menos 2 mm.

**Lea más Información de Seguridad Importante de TEPEZZA en las páginas 17 a 19 o visite [TEPEZZA.com](http://TEPEZZA.com).**

Los casos reales también muestran el uso de  
TEPEZZA en pacientes con TED por más de 10 años

**Antes del tratamiento  
con TEPEZZA**



**Después del tratamiento  
(8 infusiones)**



Paciente real que recibió tratamiento con TEPEZZA. Los resultados pueden variar según cada persona.

Antes del tratamiento con TEPEZZA, esta paciente se realizó varias cirugías, tales como:

- Tiroidectomía (extracción de la tiroides)
- Cirugía de descompresión (para reducir la protusión en los ojos)
- Cirugías de reparación de la retracción del párpado inferior (para reparar párpados retraídos)
- Cirugía para restaurar la apariencia del rostro y los ojos

A pesar de los tratamientos y las cirugías, la paciente seguía experimentando protusión en los ojos antes del tratamiento con TEPEZZA.

Vea más fotos de pacientes reales antes y después del tratamiento con TEPEZZA. Escanee el código con la cámara de su teléfono inteligente o visite [TEPEZZAphotos.com](https://www.tepezza.com/TEPEZZAphotos.com)



## Información de Seguridad Importante selecta

Informe a su médico o enfermero de inmediato si tiene alguno de estos síntomas durante o después del tratamiento con TEPEZZA: hipertensión, taquicardia, enrojecimiento de la cara o sensación de calor, dificultad para respirar, dolor de cabeza o dolor muscular.


## Cómo se administra TEPEZZA

TEPEZZA es un tratamiento de administración intravenosa (IV). Eso significa que se administra mediante una aguja que se coloca en el brazo. El proceso de administrar un tratamiento intravenoso se llama infusión. Las infusiones las administra un profesional médico, personal de enfermería titulado (RN) o de práctica avanzada (NP).

A la hora de tratar enfermedades autoinmunes como la enfermedad ocular tiroidea (TED), los tratamientos intravenosos son habituales. De hecho, los tratamientos intravenosos se usan para muchas enfermedades autoinmunes de las que probablemente haya oído hablar, como la artritis reumatoide, la enfermedad intestinal inflamatoria y la psoriasis, entre otras.

### Cada cuánto se administra la infusión

Recibirá una infusión cada 3 semanas, con un total de 8 infusiones. Eso significa que un ciclo completo de tratamiento con TEPEZZA dura aproximadamente 5 meses.



La cantidad de TEPEZZA que se le administrará en cada una de las 8 infusiones dependerá de su peso el día en que reciba la infusión.

**Lea más Información de Seguridad Importante de TEPEZZA en las páginas 17 a 19 o visite [TEPEZZA.com](http://TEPEZZA.com).**

## Cuánto dura cada infusión

Las dos primeras infusiones de TEPEZZA duran aproximadamente 90 minutos. Las 6 infusiones restantes durarán aproximadamente 60 minutos cada una, pero podrían demorarse más según cómo reaccione a estas. Sin embargo, debe planificar permanecer en el centro de infusiones durante más tiempo. Esto se debe a que deberá registrarse, le controlarán los signos vitales y, después de la infusión, lo controlarán para detectar posibles reacciones a esta.

El traslado hacia y desde el centro de infusión también puede aumentar el tiempo total.

### Infusiones 1 y 2

TIEMPO DE LA INFUSIÓN  
**90 minutos**

TIEMPO TOTAL ESTIMADO  
**2 1/2 a 4 horas**

### Infusiones 3 a 8

TIEMPO DE LA INFUSIÓN  
**60 minutos\***

TIEMPO TOTAL ESTIMADO  
**1 1/2 a 2 1/2 horas**

\*Las infusiones 3 a 8 podrían demorarse más según cómo usted reaccione a estas.

---

**Recuerde que es importante que complete las 8 infusiones.**

---

Antes de la infusión, el enfermero encargado de administrarla deberá mezclar TEPEZZA con una solución estéril para prepararla. Es posible que deba esperar que mezclen su medicamento en el centro de infusión.

## Información de Seguridad Importante selecta

Pueden presentarse reacciones en el momento de la infusión de TEPEZZA o en las 24 horas siguientes. Si usted tiene una reacción mientras recibe TEPEZZA, el médico o enfermero administrará la infusión más lentamente o la suspenderá y tratará la reacción. Si tiene una reacción grave, el médico podrá interrumpir el tratamiento por completo.

# Dónde administrarse las infusiones

Generalmente, TEPEZZA se administra en un centro de infusión. Estos centros pueden estar ubicados en:



El consultorio de su médico



Un hospital



Un centro de infusión independiente

Su proveedor del seguro puede tener una lista de ubicaciones donde pueden administrarle TEPEZZA. Asegúrese de hablar con su médico y su proveedor del seguro sobre la ubicación donde recibirá TEPEZZA. Es posible que el centro de infusión que apruebe su compañía aseguradora no sea el más cercano a su domicilio. Su coordinador de acceso de pacientes (PAL) puede ayudar a responder preguntas sobre cómo encontrar un centro de infusión después de que usted haya hablado con su médico.



Al principio, estaba nerviosa. Me dan miedo las agujas. Pero después de la primera infusión, pensé que no había sido tan malo. El personal del centro de infusión me hizo sentir muy cómoda”.

— Karen W., paciente real de TEPEZZA



## Información de Seguridad Importante selecta

Si tiene una enfermedad inflamatoria intestinal (inflammatory bowel disease, IBD), como enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, TEPEZZA puede empeorar los síntomas. Los síntomas de agravamiento de la IBD pueden incluir: aumento en la cantidad de deposiciones blandas con dolor de estómago o calambres y sangre en las heces. Después de cada infusión de TEPEZZA, informe a su médico de inmediato si los síntomas de la IBD empeoran.

## Las infusiones también se pueden administrar en el domicilio

La opción de infusiones domiciliarias le permite recibir las infusiones en la comodidad de su casa. El proceso para recibir una infusión en el domicilio es similar al que se realiza en un centro de infusiones. Sin embargo, no todos los proveedores de seguros ofrecen la infusión a domicilio como una opción. Consulte con su proveedor del seguro para asegurarse de que cubra el costo de las infusiones a domicilio. Algunos planes de seguro comerciales y programas de Medicaid o Medicare no cubren el costo de este servicio. Puede pedirle ayuda a su PAL para determinar la cobertura específica.

Hable con su médico y con su proveedor del seguro para ver si las infusiones a domicilio podrían ser la opción adecuada para usted.

## ¿Tiene preguntas sobre dónde administrarse TEPEZZA?

Hable primero con su médico acerca de las opciones. Luego, un PAL puede ayudarlo a sortear este proceso y a tomar una decisión informada.

Si quiere comunicarse con un PAL, llame al 1-833-583-7399  
De lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., hora del este (ET).

## Así es como puede verse un centro de infusión:




**Lea más Información de Seguridad Importante de TEPEZZA  
en las páginas 17 a 19 o visite [TEPEZZA.com](http://TEPEZZA.com).**

# Cómo actúa TEPEZZA

## Cómo afecta a los ojos la enfermedad ocular tiroidea

Cuando tiene TED, se enciende un interruptor llamado receptor. Esto causa que el sistema inmunitario ataque por error el tejido muscular y graso detrás de los ojos. Esto genera inflamación e hinchazón. La hinchazón produce síntomas como enrojecimiento, dolor de ojos, protusión de los ojos y visión doble. Si no se trata, la inflamación puede dar lugar a la formación de tejido cicatricial. Este tejido cicatricial puede dañar los ojos, a veces de manera permanente.




## Información de Seguridad Importante selecta

TEPEZZA puede causar un aumento de los niveles de azúcar en la sangre. Antes de comenzar el tratamiento con TEPEZZA, informe a su médico si está recibiendo tratamiento para la diabetes, sabe que sus niveles de azúcar en la sangre son elevados o le diagnosticaron diabetes. Es importante que siga los tratamientos y una alimentación adecuada para el control de la glucosa según lo indique su médico.

**A diferencia de otros medicamentos que pueda haber probado, TEPEZZA trata la enfermedad ocular tiroidea en el origen.**

TEPEZZA bloquea este receptor para impedir que se active. Mediante el bloqueo del receptor, TEPEZZA reduce la inflamación y la hinchazón de los tejidos musculares y grasos, lo cual mejora los síntomas de la enfermedad. Debido a que TEPEZZA actúa en el origen, trata la causa de la TED, no solo los síntomas.

No se conoce por completo la forma exacta en la que la TED se desarrolla y avanza; por lo tanto, tampoco se conoce por completo cómo funciona TEPEZZA (o el "mecanismo de acción").



**Mire un video para ver cómo actúa TEPEZZA detrás de los ojos. Escanee el código con la cámara de su teléfono inteligente o visite [HowTEPEZZAworks.com](http://HowTEPEZZAworks.com)**



**Lea más Información de Seguridad Importante sobre TEPEZZA en las páginas 17 a 19 o visite [TEPEZZA.com](http://TEPEZZA.com).**

# Antes de empezar con TEPEZZA

Mientras espera la aprobación del seguro, hay algunos temas importantes de los que usted y su médico deberían ocuparse y conversar antes del primer tratamiento con TEPEZZA.



## Azúcar en sangre

Antes de comenzar a administrarse TEPEZZA, hable con su médico sobre la posibilidad de hacerse un análisis y seguimiento del nivel de azúcar en sangre durante el tratamiento.

TEPEZZA puede aumentar el nivel de glucemia, por lo que antes de comenzar, pregúntele a su médico si debe hacerse ese control durante el tratamiento. Esto es especialmente importante si sabe que sus niveles de azúcar en la sangre son elevados o si le diagnosticaron diabetes.



## Enfermedad inflamatoria intestinal

Si tiene una enfermedad inflamatoria intestinal (inflammatory bowel disease, IBD), como enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, TEPEZZA puede empeorar los síntomas. Si tiene IBD, es posible que su médico quiera asegurarse de que esté bajo control antes de comenzar el tratamiento. Informe a su médico si alguno de sus síntomas de la IBD empeora mientras se administra TEPEZZA.



## Problemas de audición

TEPEZZA puede provocar problemas de audición graves, como pérdida de la audición, que en algunos casos pueden ser permanentes. Infórmele a su médico si tiene algún signo o síntoma de problemas de audición o si su audición cambia. Pregúntele a su médico cómo se realizará el seguimiento de su audición durante el tratamiento con TEPEZZA.



## Embarazo

TEPEZZA no debe usarse durante el embarazo. Antes de comenzar a usar TEPEZZA, informe a su médico si está embarazada, sospecha que lo está o planea quedar embarazada. TEPEZZA puede dañar al feto. Si está en edad fértil, debe utilizar un método de anticoncepción eficaz antes de iniciar el tratamiento con TEPEZZA, durante el tratamiento y al menos durante 6 meses después de la infusión final de TEPEZZA. El médico podría realizarle una prueba de embarazo antes de comenzar el tratamiento.

**Lea la Información de Seguridad Importante de TEPEZZA en las páginas 17 a 19 o visite [TEPEZZA.com](http://TEPEZZA.com).**

# Efectos secundarios frecuentes de TEPEZZA

Antes de comenzar el tratamiento, es posible que se pregunte sobre los posibles efectos secundarios. Los efectos secundarios más frecuentes en los estudios clínicos de TEPEZZA fueron:

<b>Efecto secundario</b>	<b>% de pacientes que lo tuvo</b>
Calambres o espasmos musculares	25 %
Náuseas	17 %
Caída del cabello	13 %
Diarrea	12 %
Sensación de cansancio	12 %
Hiper glucemia	10 %
Problemas de audición	10 %
Cambios en el sentido del gusto	8 %
Dolor de cabeza	8 %
Sequedad de la piel	8 %
Pérdida de peso	6 %
Problemas en las uñas	5 %

## Cambios en la menstruación

En estudios clínicos, aproximadamente el 23 % (5 de 22) de las mujeres que estaban menstruando notaron cambios en la menstruación. Estos cambios incluyeron pérdida de períodos, goteo y dolor o calambres menstruales.

---

La mayoría de los efectos secundarios fueron leves o moderados, y los médicos pudieron controlarlos. La mayoría de ellos desaparecieron durante o después del tratamiento.

---

# Efectos secundarios frecuentes de TEPEZZA (cont.)

---

Es importante recordar que 9 de cada 10 personas a las que se las trató con TEPEZZA en estudios clínicos completaron las 8 infusiones.

---

## Cómo detectar los signos de hiperglucemia

TEPEZZA puede causar un aumento de los niveles de azúcar en la sangre. Antes de comenzar el tratamiento con TEPEZZA, informe a su médico si está recibiendo tratamiento para la diabetes, sabe que sus niveles de azúcar en la sangre son elevados o le diagnosticaron diabetes. Es importante que siga los tratamientos y una alimentación adecuada para el control de la glucosa según lo indique su médico. Debe estar atento a los síntomas de la hiperglucemia. Si tiene alguno de estos síntomas, informe a su médico:

- Visión borrosa
- Sensación de debilidad o más cansancio del habitual
- Micción (orinar) más frecuente de lo habitual
- Aumento de la sed
- Dolor abdominal (de estómago)
- Confusión
- Boca seca
- Aliento con aroma frutal
- Pérdida del conocimiento
- Náuseas y/o vómitos
- Dificultad para respirar

---

Asegúrese de hablar con su médico sobre cómo crear el mejor plan para realizar un seguimiento de su glucemia.

---

# USO e INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

## USO

TEPEZZA es un medicamento de venta con receta que se usa para tratar la enfermedad ocular tiroidea, independientemente de si la tiene hace meses o años.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

### ¿Qué es lo más importante que debo saber sobre TEPEZZA?

Pueden presentarse reacciones en el momento de la infusión de TEPEZZA o en las 24 horas siguientes. Si usted tiene una reacción mientras recibe TEPEZZA, el médico o enfermero administrará la infusión más lentamente o la suspenderá y tratará la reacción. Si tiene una reacción grave, el médico podrá interrumpir el tratamiento por completo.

**Informe a su médico o enfermero de inmediato si tiene alguno de estos síntomas durante o después del tratamiento con TEPEZZA:**

- Hipertensión
- Taquicardia
- Enrojecimiento de la cara o sensación de calor
- Dificultad para respirar
- Dolor de cabeza
- Dolor muscular

Si tiene una enfermedad inflamatoria intestinal (inflammatory bowel disease, IBD), como enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, TEPEZZA puede empeorar los síntomas. Los síntomas de agravamiento de la IBD pueden incluir: aumento en la cantidad de deposiciones blandas con dolor de estómago o calambres y sangre en las heces. Después de cada infusión de TEPEZZA, informe a su médico de inmediato si los síntomas de la IBD empeoran.

**Lea más Información de Seguridad Importante de TEPEZZA en las páginas 18 a 19 o visite [TEPEZZA.com](http://TEPEZZA.com).**

# Información de Seguridad

## Importante continuación

TEPEZZA puede causar un aumento de los niveles de azúcar en la sangre. Antes de comenzar el tratamiento con TEPEZZA, informe a su médico si está recibiendo tratamiento para la diabetes, sabe que sus niveles de azúcar en la sangre son elevados o le diagnosticaron diabetes. Es importante que siga los tratamientos y una alimentación adecuada para el control de la glucosa según lo indique su médico.

TEPEZZA puede provocar problemas de audición graves, como pérdida de la audición, que en algunos casos pueden ser permanentes. Infórmele a su médico si tiene algún signo o síntoma de problemas de audición o si su audición cambia.

### **Antes de recibir tratamiento con TEPEZZA, informe a su médico si:**

- Tiene una enfermedad inflamatoria intestinal (como enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa).
- Lo están tratando por diabetes, le diagnosticaron diabetes o sabe que sus niveles de azúcar en la sangre son elevados.
- Está embarazada o planea quedar embarazada. TEPEZZA puede dañar al feto. Informe a su médico si queda embarazada o sospecha que está embarazada durante el tratamiento con TEPEZZA.
  - Las mujeres en edad fértil deben utilizar un método de anticoncepción eficaz antes de iniciar el tratamiento, durante el tratamiento y por al menos 6 meses después de la dosis final de TEPEZZA.
- Está amamantando o planea hacerlo. No se sabe si TEPEZZA se transmite a la leche materna. Hable con su médico sobre las mejores formas de alimentar a su bebé durante el tratamiento con TEPEZZA.
- Informe a su médico de todos los medicamentos que toma, incluidos los de venta con receta y de venta libre, las vitaminas, y los suplementos alimenticios y herbarios. Sepa qué medicamentos toma. Conserve una lista para mostrársela a su médico y al farmacéutico cuando obtenga un nuevo medicamento.

## ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de TEPEZZA?

Los efectos secundarios más frecuentes de TEPEZZA incluyen calambres o espasmos musculares, náuseas, caída del cabello, diarrea, sensación de cansancio, hiperglucemia, problemas de audición, cambios en el sentido del gusto, dolor de cabeza, sequedad de la piel, pérdida de peso, problemas en las uñas y cambios en la menstruación.

Esta no es una lista completa de todos los posibles efectos secundarios. Informe a su médico o al equipo de tratamiento si tiene algún efecto secundario.

**Le recomendamos que informe a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) de los efectos secundarios negativos de los medicamentos de venta con receta. Visite [www.fda.gov/safety/medwatch](http://www.fda.gov/safety/medwatch) o llame al 1-800-FDA-1088.**

**Visite [TEPEZZA.com](http://TEPEZZA.com) para obtener más información.**

---

La TED puede dificultar la lectura. Por eso, estamos dedicados a lograr que nuestro material sea más accesible. En Horizon, sabemos que los problemas de visión causados por la enfermedad ocular tiroidea, como la visión borrosa, la sensibilidad a la luz y la visión doble, pueden dificultar la lectura o el enfoque. Por eso, evaluamos cuáles son las fuentes que se leen con más facilidad. El resultado es la fuente que ve aquí, llamada "Tiresias". La diseñó el Royal National Institute of Blind People específicamente para personas con visión deficiente.

---



Cuando me diagnosticaron enfermedad ocular tiroidea, tuve que dejar de hacer muchas cosas. Sin embargo, después del tratamiento con TEPEZZA, mis síntomas desaparecieron y no regresaron. Volví a administrar mi empresa de bienes raíces. Puedo conducir. Y puedo tejer nuevamente. Probablemente aprecio estas cosas ahora más que nunca. Es una sensación maravillosa”.

— Randi C., paciente real de TEPEZZA



Mire las historias de Randi y de otros pacientes. Escanee el código con la cámara de su teléfono inteligente o visite [TEPEZZAstories.com](https://www.tepezzastories.com)



### Información de Seguridad Importante selecta

Los efectos secundarios más frecuentes de TEPEZZA incluyen calambres o espasmos musculares, náuseas, caída del cabello, diarrea, sensación de cansancio, hiperglucemia, problemas de audición, cambios en el sentido del gusto, dolor de cabeza, sequedad de la piel, pérdida de peso, problemas en las uñas y cambios en la menstruación.

Lea más Información de Seguridad Importante de TEPEZZA en las páginas 17 a 19 o visite [TEPEZZA.com](https://www.tepezza.com).