

Paso 2: Identifique sus posibles signos y síntomas

En el último mes, ¿tuvo alguno de los siguientes síntomas de la enfermedad ocular tiroidea (TED)? (Marque todas las casillas que correspondan).

¿Alguna vez tuvo dolor o presión detrás del ojo?

El término médico para esto es "dolor orbital espontáneo"

Al mirar hacia la izquierda y la derecha, o hacia arriba y abajo, ¿alguna vez sintió incomodidad o dolor detrás del ojo?

El término médico para esto es "dolor orbitario al mirar"

¿Ha tenido hinchazón en el párpado?

El término médico para esto es "edema palpebral"

¿Alguna vez sintió los ojos hinchados o los vio enrojecidos?

El término médico para esto es "eritema del párpado"

¿Alguna vez notó un enrojecimiento de las partes blancas de los ojos?

El término médico para esto es "enrojecimiento de conjuntivas"

¿Alguna vez observó la presencia de pus o áreas con hinchazón y ampollas en los ojos?

El término médico para esto es "quemosis"


¿Alguna vez notó uno o ambos ojos abultados?

Los términos médicos para esto son "proptosis" o "exoftalmos"

Cuando se mira en el espejo y mueve los ojos, ¿alguna vez siente que un ojo se mueve más lento que el otro? (Es posible que también note dos imágenes, es decir, visión doble, al mirar en cierta dirección)

¿Alguna vez notó dificultades para leer carteles de la calle, o subtítulos en la televisión o en las películas?

¿Alguna vez tuvo inflamación en las áreas del ojo conocidas como carúncula o plica (ver ilustración en la siguiente página)?



Ahora cuente el número de síntomas que marcó arriba e ingrese el total en la casilla a continuación.

Comparta este número con su doctor para ayudarlo a evaluar sus síntomas.

Síntomas adicionales de seguimiento

En el último mes, ¿tuvo alguno de estos síntomas adicionales de la enfermedad ocular tiroidea (TED)? (Marque las casillas que correspondan).

Ojos secos y arenosos

Ojos llorosos y lagrimosos

Visión borrosa

Sensibilidad a la luz

Párpados caídos o con tics

Párpados retraídos

Vista en distintas direcciones con cada ojo

Visión doble

Pérdida de la visión de los colores

Pérdida de la vista

Paso 3: Díganos cómo la TED afecta su bienestar y su vida diaria

A la hora de tomar una decisión sobre su tratamiento de la TED, también es importante que su doctor entienda el impacto de la TED en su capacidad para realizar tareas diarias y en su bienestar general.

Bienestar

Los efectos emocionales de la TED no deben ignorarse. Es importante que hable con el médico sobre cómo la TED afecta todos los aspectos de su vida. En el último mes, ¿tuvo alguna de las siguientes sensaciones? (Marque las casillas que correspondan).

Sentimientos de depresión

Ansiedad

Sensación de que lo están observando o juzgando

Deseo de esconder su apariencia en público

Dificultad para hacer expresiones faciales normales

Dificultad para mantener conversaciones cara a cara

Sensación de desconexión de sus amigos, su familia y sus pasatiempos

¿Hay otras formas en las que la TED haya cambiado cómo se siente con usted mismo? (Use el espacio de abajo para escribir su respuesta).

Impacto en la vida diaria

Durante el mes pasado, ¿la enfermedad ocular tiroidea (TED) le dificultó hacer alguna de estas tareas diarias? (Marque las casillas que correspondan).

Caminar al aire libre

Leer

Conducir

Ver televisión

Cocinar

Trabajar

Subir o bajar escaleras

¿No pudo hacer otras actividades o pasatiempos que quería hacer debido a la TED? (Use el espacio de abajo para escribir su respuesta).

Paso 4: Indique todos sus tratamientos anteriores

¿Qué ha utilizado anteriormente para tratar su enfermedad ocular tiroidea (TED)? (Marque las casillas que correspondan).

Gotas o gel ocular

Corticoides

Radioterapia

Cirugía

Use el espacio de abajo para escribir cualquier otro tratamiento anterior.

Paso 5: Pregunte al médico sobre TEPEZZA (teprotumumab-trbw)

¿En qué se diferencia TEPEZZA de otros tratamientos?

¿Cómo podría TEPEZZA reducir algunos de mis síntomas de la TED?

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de TEPEZZA?

¿Es TEPEZZA adecuado para mí?

Consulte la Información de Seguridad Importante en las páginas 9 y 10 y la Información farmacológica completa en TEPEZZA.com.

Más preguntas para el médico

Use el espacio de abajo para escribir otras preguntas que tenga.



Tome selfis para hacer un seguimiento de sus cambios

Tomarse selfis es una buena manera de hacer un seguimiento de cómo cambian sus síntomas y su apariencia con el tiempo. Cuando tome la selfi, intente acercar la imagen a los ojos y asegúrese de que la cara esté bien iluminada.

Si tiene preguntas sobre la enfermedad ocular tiroidea (TED), sobre TEPEZZA o sobre esta guía, comuníquese con un enfermero asesor llamando al **1-844-483-7399**, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m., hora del este.

Los enfermeros asesores no brindan ni atención ni asesoramiento médicos individuales a los pacientes.

Consulte la Información de Seguridad Importante en las páginas 9 y 10 y la Información farmacológica completa en [TEPEZZA.com](https://www.tepezza.com).

USO e INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

USO

TEPEZZA es un medicamento de venta con receta que se usa para tratar la enfermedad ocular tiroidea, independientemente de si la tiene hace meses o años.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

¿Qué es lo más importante que debo saber sobre TEPEZZA?

Pueden presentarse reacciones en el momento de la infusión de TEPEZZA o en las 24 horas siguientes. Si usted tiene una reacción mientras recibe TEPEZZA, el médico o enfermero administrará la infusión más lentamente o la suspenderá y tratará la reacción. Si tiene una reacción grave, el médico podrá interrumpir el tratamiento por completo.

Informe a su médico o enfermero de inmediato si tiene alguno de estos síntomas durante o después del tratamiento con TEPEZZA.

- Hipertensión
- Taquicardia
- Enrojecimiento de la cara o sensación de calor
- Dificultad para respirar
- Dolor de cabeza
- Dolor muscular

Si tiene una enfermedad inflamatoria intestinal (inflammatory bowel disease, IBD), como enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, TEPEZZA puede empeorar los síntomas. Los síntomas de agravamiento de la IBD pueden incluir: aumento en la cantidad de deposiciones blandas con dolor de estómago o calambres y sangre en las heces. Después de cada infusión de TEPEZZA, informe a su médico de inmediato si los síntomas de la IBD empeoran.

TEPEZZA puede causar un aumento de los niveles de azúcar en la sangre. Antes de comenzar el tratamiento con TEPEZZA, informe a su médico si está recibiendo tratamiento para la diabetes, sabe que sus niveles de azúcar en la sangre son elevados o le diagnosticaron diabetes. Es importante que siga los tratamientos y una alimentación adecuada para el control de la glucosa según lo indique su médico.

TEPEZZA puede provocar problemas de audición graves, como pérdida de la audición, que en algunos casos pueden ser permanentes. Infórmele a su médico si tiene algún signo o síntoma de problemas de audición o si su audición cambia.

(Continúa en la siguiente página)

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

Antes de recibir tratamiento con TEPEZZA, informe a su médico si:

- Tiene una enfermedad inflamatoria intestinal (como enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa).
- Lo están tratando por diabetes, le diagnosticaron diabetes o sabe que sus niveles de azúcar en la sangre son elevados.
- Está embarazada o planea quedar embarazada. TEPEZZA puede dañar al feto. Informe a su médico si queda embarazada o sospecha que está embarazada durante el tratamiento con TEPEZZA.
 - o Las mujeres en edad fértil deben utilizar un método de anticoncepción eficaz antes de iniciar el tratamiento, durante el tratamiento y por al menos 6 meses después de la dosis final de TEPEZZA.
- Está amamantando o planea hacerlo. No se sabe si TEPEZZA se transmite a la leche materna. Hable con su médico sobre las mejores formas de alimentar a su bebé durante el tratamiento con TEPEZZA.
- Informe a su médico de todos los medicamentos que toma, incluidos los de venta con receta y de venta libre, las vitaminas, y los suplementos alimenticios y herbarios. Sepa qué medicamentos toma. Conserve una lista para mostrársela a su médico y al farmacéutico cuando obtenga un nuevo medicamento.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de TEPEZZA?

Los efectos secundarios más frecuentes de TEPEZZA incluyen calambres o espasmos musculares, náuseas, caída del cabello, diarrea, sensación de cansancio, hiperglucemia, problemas de audición, cambios en el sentido del gusto, dolor de cabeza, sequedad de la piel, pérdida de peso, problemas en las uñas y cambios en la menstruación.

Esta no es una lista completa de todos los posibles efectos secundarios. Informe a su médico o al equipo de tratamiento si tiene algún efecto secundario.

Le recomendamos que informe a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) de los efectos secundarios negativos de los medicamentos de venta con receta.

Visite www.fda.gov/safety/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Visite TEPEZZA.com para obtener más información.

AMGEN

TEPEZZA
teprotumumab-trbw